

Las principales causas de fallecimiento en 2003 fueron las enfermedades del aparato circulatorio y los tumores

Fallecieron 19.305 personas, 686 más que el año anterior, pero disminuyó el crecimiento vegetativo negativo

El número de fallecidos en la C. A. de Autónoma de Euskadi en 2003 ascendió a 19.305, 10.050 varones y 9.255 mujeres, 686 defunciones más que el año anterior. Esta cifra supuso un aumento de un 3,7% con respecto a 2002, según datos de EUSTAT.

Se produjeron 38 muertes más que nacimientos por lo que, como ocurre desde 1990, el crecimiento vegetativo fue negativo, aunque menor en números absolutos que el año anterior. Por territorios, se produjeron saldos positivos en Álava y Gipuzkoa, que ganaron 337 y 503 personas, respectivamente. Por el contrario, en el caso de Bizkaia, el número de defunciones superó al de nacimientos (-878).

La edad media de los fallecidos se situó en 76,2 años, mientras que en 1990 estaba en 71 años, es decir, se ha producido un aumento de 5,2 años. Por sexo, los varones fallecieron a los 72,2 años de media y las mujeres a los 80,5.

En cuanto a la mortalidad infantil, fallecieron 3,2 menores de un año por cada mil nacidos. La mortalidad neonatal, producida en los primeros 28 días de vida, contabilizó 41 defunciones: 24 se debieron a la mortalidad neonatal precoz, ocurrida en la primera semana, de las cuales 13 se produjeron durante las primeras 24 horas. Entre los menores de un año, las defunciones de varones (33) superaron las de las mujeres (29).

El 30,5% de las defunciones ocurridas en 2003, 5.891 muertes, se debieron a enfermedades del aparato circulatorio; a continuación se situaron los tumores, con un 28,7% (5.548 defunciones) y, en tercer lugar, a mayor distancia, las enfermedades respiratorias, que supusieron el 10,7% (2.066).

El motivo de las defunciones fue distinto según el sexo, ya que entre los varones los tumores superaron a las enfermedades del aparato circulatorio, mientras que entre las mujeres la principal causa fueron las enfermedades cardiovasculares y en segundo lugar los tumores.

Así mismo, la causa de defunción varió con la edad. En los menores de un año, las defunciones más frecuentes fueron debidas a enfermedades originadas en el período perinatal y a anomalías congénitas; hasta los 34 años las principales causas de fallecimiento fueron externas; de 35 a 74 años fueron los tumores y a partir de los 75 años las enfermedades del aparato circulatorio.

Entre las muertes por causas externas, destacaron los accidentes de tráfico con 260 defunciones y los suicidios con 161. En ambos casos fallecieron mayor número de

varones que de mujeres: 184 varones y 76 mujeres por accidente de tráfico y 121 varones y 40 mujeres por suicidios.

Gráfico 1: Defunciones por causa y sexo (%)




Tabla 1: Defunciones por sexo, según la causa.

	Varones		Mujeres	
	Nº	%	Nº	%
Todas las causas	10.050		9.255	
Enfermedades infecciosas y parasitarias	200	2,0	183	2,0
Tumores	3.521	35,0	2.027	21,9
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	221	2,2	338	3,7
Trastornos mentales y del comportamiento	251	2,5	532	5,7
Enfermedades del sistema nervioso	322	3,2	606	6,5
Enfermedades del sistema circulatorio	2.718	27,0	3.173	34,3
Enfermedades del sistema respiratorio	1.128	11,2	938	10,1
Enfermedades del sistema digestivo	596	5,9	445	4,8
Enfermedades del sistema genitourinario	189	1,9	216	2,3
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	226	2,2	332	3,6
Causas externas de mortalidad	562	5,6	244	2,6
Otras	116	1,2	221	2,4

Fuente: EUSTAT

Para más información:

Euskal Estatistika-Erakundea / Instituto Vasco de Estadística

C/ Donostia-San Sebastian, 1 01010 Vitoria-Gasteiz

Tlf:+34-945-01 75 00 Fax:+34-945-01 75 01 E-mail: eustat@eustat.es

Persona de contacto: Martín González Hernández

Tlf:+34-945-01 75 49 Fax:+34-945-01 75 01

Notas de prensa en Internet: www.eustat.es

Banco de datos: www.eustat.es/bancopx/spanish/indice.asp